

GEBRAUCHSANWEISUNG / ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO /  
MODE D'EMPLOI / GEBRUIKSAANWIJZING

Adhäsiver Silikon-Schaumverband mit Hydrofiber™ Technologie /  
Medicazione in Schiuma e Hydrofiber™ con Strato Adesivo in  
Silicone / Pansement hydrocellulaire Hydrofiber™ adhésif siliconé /  
Klevend siliconen Hydrofiber™ schuimverband



[www.convatec.com](http://www.convatec.com)



## de DEUTSCH

## PRODUKTBESCHREIBUNG

ConvaFoam® Silicone ist ein steriler Hydrofiber™ Schaumstoff-Wundverband und besteht aus:

- einer duschdichten, atmungsaktiven äußeren Polyurethanfolie, die als Barriere gegen Bakterien und Viren dient.
- einem weichen, mehrlagigen saugfähigen Wundkissen, das Polyurethanschaum, superabsorbierende Fasern und eine Wundkontaktebeschichtung aus Hydrofiber™ (Natrium-Carboxymethylcellulose) enthält, und einer perforierten adhäsiven Silikonschicht/Wundkontaktebeschichtung. Das Wundkissen absorbiert und speichert Feuchtigkeit, Exsudat und Bakterien.
- einer perforierten adhäsiven Silikonschicht/Hautkontaktebeschichtung zur Befestigung des Verbandes an der Haut.

## KLINISCHER NUTZEN

Der ConvaFoam® Silicone Verband ist dafür konzipiert, eine feuchte Umgebung für die Wundheilung zu schaffen und gleichzeitig überschüssige Exsudatmengen, die das Wundbett und die wundumgebende Haut weiter schädigen können, effektiv zu behandeln.

Der ConvaFoam® Silicone Wundverband ist dafür konzipiert, die intakte Haut vor Schädigungen durch Feuchtigkeit, Scherkräfte und Reibung zu schützen.

## ZWECKBESTIMMUNG

ConvaFoam® Silicone Wundverbände können unter medizinischer Aufsicht zur Behandlung von exsudierenden und nicht exsudierenden Wunden sowie zum Schutz der intakten Haut eingesetzt werden.

ConvaFoam® Silicone Wundverbände können auch auf intakter Haut als Teil der Prävention von Druckverletzungen verwendet werden.

ConvaFoam® Silicone Wundverbände können als Primär- oder Sekundärverband eingesetzt werden.

## INDIKATIONEN

ConvaFoam® Silicone Wundverband ist indiziert für die Behandlung von:

- Ulcera cruris
- Dekubitus
- Diabetische Fußulzera
- Chirurgische Wunden
- Traumatische Wunden

## KONTRAINDIKATIONEN

ConvaFoam® Silicone Wundverbände sollten nicht bei bekannten Unverträglichkeiten gegen den Wundverband oder die oben unter „Produktbeschreibung“ angegebenen Bestandteile des Wundverbands verwendet werden.

## VORGESEHENHE ANWENDER

ConvaFoam® Silicone Wundverbände sind zur Verwendung durch medizinische Fachkräfte, Pflegekräfte und Patienten unter Aufsicht einer medizinischen Fachkraft bestimmt.

## VORGESEHENHE PATIENTENZIELGRUPPE

ConvaFoam® Silicone Wundverbände sind für die Verwendung bei Patienten mit einer der in den Indikationen aufgeführten Wundarten bestimmt, die einen Schutz der Haut vor Beschädigung benötigen oder zur Prävention von Druckverletzungen auf intakter Haut.

## VORSICHTSMASSNAHMEN

ConvaFoam® Silicone Wundverbände sind Einwegartikel und dürfen nicht wieder verwendet werden.

Eine Wiederverwendung des Produkts kann ein erhöhtes Infektionsrisiko, Kreuzkontaminierung und verzögerte Heilung zur Folge haben.

ConvaFoam® Silicone Wundverbände sind nicht mit Produkten auf Ölbasis kompatibel.

Tragen Sie keine Oxidationslösungen wie Wasserstoffperoxid oder Hypochloritlösungen auf den Verband auf.

Wenn Oxidationsmittel im Rahmen eines Pflegeprotokolls verwendet werden, stellen Sie sicher, dass die Wunde und die wundumgebende Haut trocken und frei von jeglichen Rückständen von Oxidationsmitteln sind, bevor Sie den Verband anlegen.

Dieser Verband sollte mit keinen anderen Wundversorgungsprodukten verwendet werden, ohne vorher eine medizinische Fachkraft zu konsultieren. ConvaFoam® Silicone Wundverbände sollten beim Baden oder Schwimmen nicht untergetaucht werden.

In folgenden Fällen ist eine medizinische Fachkraft zu informieren:

- Reizung (Rötung, Entzündung)
- Mazeration (Aufweichung der Haut mit weißer Verfärbung)
- Hypergranulation (übermäßiges Gewebewachstum)
- Empfindlichkeit oder allergische Reaktion
- Anzeichen einer Infektion (zunehmende Schmerzen, Blutung, Wärme/Rötung des wundumgebenden Gewebes, Wundexsudat)
- Veränderung der Wundfarbe und/oder des Wundgeruchs
- Vergroßerung der Wundfläche
- Wunde zeigt keine Heilungsanzeichen

Nach seiner Verwendung kann das Produkt eine mögliche biologische Gefahr darstellen. Es muss gemäß allgemein anerkannter medizinischer Praxis sowie den anwendbaren lokalen Gesetzen und Vorschriften gehandhabt und entsorgt werden.

Wenn während der Verwendung dieses Produkts oder als Folge seiner Verwendung ein schwerwiegendes Vorkommen eingetreten ist, melden Sie dies bitte dem Hersteller unter [www.convatec.com](http://www.convatec.com) und der zuständigen nationalen Behörde in dem Mitgliedstaat, in dem der Anwender und/oder Patient ansässig ist.

## KONTAKT UND DAUER DER ANWENDUNG

ConvaFoam® Silicone Wundverbände können bis zu 7 Tage lang getragen werden. Bei entsprechender klinischer Indikation muss der Verbandwechsel früher erfolgen. Der Verband ist für die kontinuierliche Anwendung sicher.

## ANWENDUNGSHINWEISE

## 1. Lagerung:

- Bei Raumtemperatur lagern.
- Lichtgeschützt aufbewahren.
- Trocken aufbewahren.
- Sicherstellen, dass die Verbandverpackung vor Gebrauch unbeschädigt geblieben ist und nicht geöffnet wurde, damit die Sterilität gewährleistet ist. Nicht verwenden, wenn der Verband oder die Verpackung vor Gebrauch beschädigt oder geöffnet wurde. In diesem Fall gemäß den vor Ort geltenden Vorschriften entsorgen.
- Nicht nach dem Verfallsdatum verwenden.

## 2. Vorbereitung und Reinigung der Wunde und der Haut:

- Stellen Sie vor dem Anlegen des Verbands sicher, dass die Haut um die Wunde frei von Cremes, rückfettenden Produkten und Produkten auf Ölbasis ist, die verhindern können, dass der Verband haftet.
- Reinigen Sie vor dem Anlegen des Verbands den Wundbereich mit einem geeigneten Produkt zur Wundreinigung und trocknen Sie die wundumgebende Haut.
- Wenn ein Hautschutz erforderlich ist, wählen Sie ein Spray bzw. eine Flüssigkeit, das bzw. die vor dem Anlegen des Verbands trocken.

## 3. Vorbereitung und Anlegen des Verbands:

- a. Wenn der Verband auf einer Wunde angelegt wird, wählen Sie eine angemessene Verbandgröße, sodass das zentrale Wundkissen auf allen Seiten mindestens 1 cm (1/3 Zoll) größer ist als die Wundfläche.
- b. Wenn der Verband auf intakter Haut angelegt wird, wählen Sie eine Größe, die den gesamten gefährdeten Bereich abdeckt.
- c. Entnehmen Sie den Verband aus der sterilen Verpackung. Entfernen Sie die Schutzfolie. Berühren Sie die Haftfläche möglichst nicht.
- d. Halten Sie den Verband so über die Wunde bzw. den zu schützenden Hautbereich, dass die Mitte des Verbands über dem Zentrum der Wunde bzw. des zu schützenden Hautbereichs liegt.
- e. Stellen Sie sicher, dass der Verband beim Anbringen nicht gedehnt wird. Streichen Sie den Haftrand glatt. Stellen Sie sicher, dass an den Gelenken ausreichend Flexibilität besteht, um die Mobilität des Patienten zu gewährleisten. Bei Bedarf können die Verbände passend zugeschnitten werden. Entsorgen Sie nach dem Abdecken der Wunde den unbenutzten Teil des Produkts. Verwenden Sie zusätzliche Fixierstreifen oder einen Folienverband, um eine Barriere zu schaffen.

## 4. Abnehmen des Verbands:

- a. Der Verband sollte gewechselt werden, wenn dies klinisch indiziert ist, wenn er mit Wundflüssigkeit gesättigt ist, wenn er undicht wird oder wenn er beschädigt bzw. verschmutzt ist.
- b. Wenn sich das Abnehmen des Verbands schwierig gestaltet, den Verband mit steriler Kochsalzlösung oder steriellem Wasser anfeuchten und langsam entfernen.
- c. Um den Verband zu entfernen, drücken Sie leicht auf die Haut unmittelbar neben den Verband und heben Sie eine Ecke des Verbands vorsichtig an. Heben Sie den Verband weiter an, bis der gesamte Rand des Verbands von der Haut gelöst ist. Heben Sie den Verband vorsichtig von der Wunde ab und entsorgen Sie ihn vorsichtigerweise.

## Verwendung zum Schutz vor Läsionen intakter Haut:

Nur bei der Verwendung zum Schutz vor Läsionen intakter Haut darf eine Ecke des Verbands zur Hautinspektion angehoben und wieder versiegelt werden. Bei beschädigter Haut muss der Verband gewechselt werden.

Wenn Sie weitere Informationen oder Anleitungen benötigen oder ein unerwünschtes Ereignis melden möchten, wenden Sie sich bitte an Convatec. Die Kontaktdetails finden Sie unter [www.convatec.com](http://www.convatec.com) oder am Ende dieses Dokuments.

Hergestellt in Großbritannien  
© 2024 Convatec.

™ kennzeichnet eine eingetragene Marke der Convatec Group.

## it ITALIANO

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ConvaFoam® Silicone è una medicazione per lesioni sterili, in schiuma Hydrofiber™, composta da:

- una pellicola esterna in poliuretano resistente all'esposizione accidentale all'acqua, traspirante, che fornisce una barriera batterica e virale;
- un tampone centrale assorbente, multistrato, morbido, contenente schiuma di poliuretano, fibre superassorbenti, Hydrofiber™ (carbossimetilcellulosa sodica) e uno strato adesivo in silicone perforato a contatto con la lesione;
- Il tampone assorbe e trattiene umidità, essudato e batteri;
- uno strato adesivo in silicone perforato a contatto con la lesione/cute, che fissa la medicazione alla cute.

## BENEFICI CLINICI

La medicazione ConvaFoam® Silicone è concepita per fornire alla lesione un ambiente di guarigione umido e gestire al contempo i livelli eccessivi di essudato che potrebbero danneggiare ulteriormente il letto della lesione e la cute circostante.

La medicazione ConvaFoam® Silicone è concepita per proteggere la cute intatta dai danni causati dall'umidità, dalle lacerazioni e dall'attrito.

## USO PREVISTO

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone possono essere usate, con la consulenza di un operatore sanitario, per la gestione di lesioni essudanti e non essudanti e per la protezione della cute intatta.

Le medicazioni ConvaFoam® possono essere utilizzate anche sulla cute intatta come parte del protocollo di prevenzione delle lesioni da pressione.

La medicazione ConvaFoam® Silicone può essere usata come medicazione primaria o secondaria.

## INDICAZIONI TERAPEUTICHE

La medicazione ConvaFoam® Silicone è indicata per la gestione di:

- Ulcere alle gambe
- Lesioni da pressione
- Ulcere del piede diabetico
- Ferite chirurgiche
- Ferite traumatiche

## CONTROINDICAZIONI

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone non devono essere usate su individui che abbiano manifestato sensibilità o una reazione allergica alla medicazione o ai componenti indicati sopra nella descrizione del prodotto.

## UTILIZZATORI PREVISTI

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone sono destinate all'uso da parte di operatori sanitari, pazienti e caregiver.

## POPOLAZIONE DI PAZIENTI DESTINATARI

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone sono destinate all'uso su pazienti con uno dei tipi di ferita elencati nelle indicazioni, che necessitano di protezione della pelle dalla rottura o per la prevenzione di lesioni da pressione su pelle intatta come parte del protocollo di prevenzione delle lesioni da pressione.

## PRECAUZIONI

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone sono esclusivamente monouso. Non riutilizzare.

Il riutilizzo può comportare un aumento del rischio di infezione, contaminazione crociata e una guarigione ritardata.

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone non sono compatibili con prodotti oleosi.

Alla medicazione non vanno applicate soluzioni ossidanti come quelle a base di perossido di idrogeno o ipoclorito di sodio.

Se si utilizzano agenti ossidanti nell'ambito di un protocollo di cura, prima di applicare la medicazione occorre accertarsi che la lesione e la cute circostante siano asciutte e libere da qualsiasi residuo di agente ossidante.

Questa medicazione non deve essere utilizzata con altri prodotti per il trattamento delle lesioni senza aver prima consultato un operatore sanitario.

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone non possono essere immerse durante il bagno o in piscina.

Consultare un operatore sanitario se si osserva una delle seguenti situazioni:

- irritazione (arrossamento, infiammazione)
- macerazione (sbiancamento cutaneo)
- ipergranulazione (formazione di tessuto in eccesso)
- sensibilità o reazione allergica
- segni di infezione (aumento del dolore, sanguinamento, calore/arrossamento nel tessuto circostante, essudato della lesione)
- alterazioni del colore e/o dell'odore della lesione
- aumento delle dimensioni della lesione
- assenza di segni di guarigione della lesione

Dopo l'uso il prodotto può rappresentare un potenziale rischio biologico.

Maneggiare e smaltire il prodotto in conformità con le prassi mediche accettate e con le leggi e i regolamenti locali vigenti.

Se dovesse verificarsi un incidente grave durante l'uso di questo dispositivo o come conseguenza del suo utilizzo, segnalare la problematica al fabbricante su [www.convatec.com](http://www.convatec.com) e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono l'utilizzatore e/o il paziente.

## CONTATTO E DURATA DI UTILIZZO

Le medicazioni ConvaFoam® Silicone possono restare applicate per un massimo di 7 giorni, ma devono essere sostituite prima, se clinicamente indicato; il loro uso continuativo è considerato sicuro.

## ISTRUZIONI PER L'USO

## 1. Conservazione

- Conservare a temperatura ambiente.
- Proteggere dalla luce.
- Conservare in luogo asciutto.
- Per assicurarsi della sterilità del prodotto, verificare che la confezione della singola medicazione sia integra e non sia stata aperta prima dell'utilizzo. Se la medicazione (o la sua confezione sterile) è danneggiata o aperta, non utilizzarla e smaltirla secondo i regolamenti locali.
- Non usare oltre la data di scadenza.

## 2. Preparazione del sito della lesione e pulizia della cute:

- Prima di applicare la medicazione, assicurarsi che la cute circostante sia priva di creme, prodotti idratanti e prodotti oleosi che potrebbero impedire l'adesione della medicazione.
- Prima di applicare la medicazione, pulire l'area con un detergente per lesioni adeguato e asciugare la cute circostante.
- Se è necessario un prodotto per la gestione dell'umidità, scegliere uno spray o un liquido che asciughi prima dell'applicazione della medicazione.

## 3. Preparazione e applicazione della medicazione:

- a. Quando si applica la medicazione su una lesione, sceglierne una di dimensioni appropriate, con il tampone assorbente centrale più grande di almeno 1 cm (1/3 di pollice) rispetto alla lesione.
- b. Quando viene applicata sulla cute intatta, scegliere una medicazione che copra l'intera area vulnerabile.
- c. Estrarre la medicazione dalla confezione sterile. Rimuovere il rivestimento protettivo. Cercare di non toccare la superficie adesiva.
- d. Posizionare la medicazione sopra la lesione o l'area della cute da proteggere e allineare il centro della medicazione con il centro della lesione o dell'area della cute da proteggere.
- e. Evitare di distendere la medicazione durante l'applicazione. Appianare il bordo adesivo. Assicurarsi che le articolazioni siano sufficientemente flesse per consentire la mobilità del paziente. La medicazione può essere tagliata se è necessario adattarla. Dopo aver posizionato la medicazione sulla lesione scart

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Convatec® Silicone est un pansement hydrocellulaire stérile issu de la technologie Hydrofiber™ composé:

- d'un film de polyuréthane externe imperméable à l'eau et semi-perméable qui constitue une barrière contre les bactéries et les virus.
- d'une compresse centrale souple, multicouche et absorbante, contenant une mousse polyuréthane, des fibres superabsorbantes, une couche Hydrofiber™ (carboxyméthylcellulose sodique) et une couche de silicone perforée adhésive au contact du lit de la plaie. La compresse absorbe et retient l'humidité, l'exsudat et les bactéries.
- d'une couche de silicone perforée adhésive en contact avec la peau/plaie pour maintenir le pansement en place sur la peau.

**BÉNÉFICES CLINIQUES**

Les pansements Convatec® Silicone sont conçus pour fournir un milieu humide favorable à la cicatrisation de la plaie, tout en prenant en charge efficacement les niveaux excessifs d'exsudat qui peuvent endommager davantage le lit de la plaie et la peau périplaïenne.

Les pansements Convatec® Silicone sont conçus pour protéger la peau saine contre les dommages causés par l'humidité, le cisaillement et le frottement.

**UTILISATION PRÉVUE**

Les pansements Convatec® Silicone peuvent être utilisés, sur avis d'un professionnel de santé, pour la prise en charge des plaies exsudatives et non exsudatives et pour la protection de la peau saine.

Les pansements Convatec® Silicone peuvent être intégrés dans un protocole de prévention d'escarre pour protéger la peau saine.

Les pansements Convatec® Silicone peuvent être utilisés comme pansement primaire ou secondaire.

**INDICATIONS**

Les pansements Convatec® Silicone sont indiqués dans la prise en charge des:

- Ulcères de la jambe
- Escarres
- Ulcères du pied diabétique
- Plaies chirurgicales
- Plaies traumatiques

**CONTRE-INDICATIONS**

Les pansements Convatec® Silicone ne doivent pas être utilisés chez les personnes présentant une sensibilité, ou une allergie connue au pansement ou à l'un de ses composants mentionnés dans la description du produit.

**UTILISATEURS CIBLÉS**

Les pansements Convatec® Silicone sont utilisés par les professionnels de santé, les patients et les soignants.

**POPULATION DE PATIENTS CIBLÉE**

Les pansements Convatec® Silicone sont destinés à être utilisés chez des patients présentant l'un des types de plaies répertoriés dans les indications ou pour ceux ayant besoin d'une protection pour protéger la peau saine dans le cadre d'un protocole de prévention d'escarre.

**PRÉCAUTIONS**

Les pansements Convatec® Silicone sont à usage unique exclusivement. Ne pas réutiliser.

Toute réutilisation peut entraîner un risque accru d'infection et de contamination croisée ainsi qu'un retard de cicatrisation.

Les pansements Convatec® Silicone ne sont pas compatibles avec les produits à base d'huile.

Ne pas appliquer de solutions oxydantes telles que du peroxyde d'hydrogène ou des solutions d'hypochlorite sur le pansement.

Si des agents oxydants sont utilisés dans le cadre d'un protocole de soins, s'assurer que la plaie et la peau périplaïenne sont sèches et exemptes de tout résidu d'agent oxydant avant d'appliquer le pansement.

Ce pansement ne doit pas être utilisé avec d'autres produits pour le soin des plaies sans avis préalable d'un professionnel de santé.

Les pansements Convatec® Silicone ne doivent pas être immergés pendant les bains ou la natation.

Consulter un professionnel de santé si l'un des signes suivants est observé:

- Irritation (rougeur, inflammation).
- Macération (blanchiment de la peau).
- Hyperbourgogne (formation excessive de tissu de granulation).
- Sensibilité ou réaction allergique.
- Signes d'infection (augmentation de la douleur, saignement, chaleur/ rougeur des tissus environnants, exsudat de la plaie).
- Modifications de la couleur et/ou de l'odeur de la plaie.
- Augmentation de la taille de la plaie.
- Absence de signes de cicatrisation de la plaie.

Après utilisation, ce produit peut présenter un danger biologique potentiel. Manipuler et éliminer conformément aux bonnes pratiques médicales et aux lois et règlements locaux en vigueur.

Si, lors de l'utilisation de ce dispositif ou à la suite de son utilisation, un incident grave survient, il convient de le signaler au fabricant à l'adresse medreg@convatec.com et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient sont établis.

**TEMPS DE PORT ET DURÉE D'UTILISATION**

Les pansements Convatec® Silicone peuvent rester en place jusqu'à 7 jours.

Les pansements doivent être changés plus tôt quand cela est cliniquement indiqué, et ils peuvent être utilisés au long cours.

**MODE D'EMPLOI****1. Stockage**

- Conserver à température ambiante.
- Protéger de la lumière.
- Conserver au sec.
- Vérifier que l'emballage individuel du pansement n'est pas endommagé ou ouvert avant de l'utiliser afin de garantir la stérilité. Si le pansement ou l'emballage individuel sont endommagés ou ouverts, ne pas utiliser et éliminer conformément aux réglementations locales.
- Ne pas utiliser le dispositif après la date d'expiration.

**2. Préparation du lit de la plaie et nettoyage de la peau:**

- Avant d'appliquer le pansement, s'assurer que la peau périplaïenne est exempte de crèmes, d'agents hydratants et de produits à base d'huile qui pourraient empêcher l'adhérence du pansement.
- Avant toute application du pansement, nettoyer la plaie avec un produit de nettoyage pour plaies approprié et sécher la peau périplaïenne.
- Si une barrière protectrice contre l'humidité est nécessaire, choisir un spray ou un liquide qui séchera avant l'application du pansement.

**3. Préparation et application du pansement:**

- Lors de l'application sur une plaie, choisir une taille de pansement appropriée de sorte que la compresse absorbante centrale dépasse d'au moins 1 cm (1/3 po) sur la peau périplaïenne.
- En cas d'application sur une peau saine, choisir un pansement qui couvre toute la zone vulnérable.
- Retirer le pansement de l'emballage stérile. Retirer le film protecteur du pansement. Éviter de toucher la surface adhésive.
- Maintenir le pansement sur la plaie ou la zone cutanée à protéger et aligner le centre du pansement sur celui de la plaie ou de la zone cutanée à protéger.
- S'assurer que le pansement ne soit pas étiré lors de l'application. Lisser la bordure adhésive. S'assurer que les articulations sont suffisamment fléchies pour permettre la mobilité du patient. Si nécessaire, les pansements peuvent être découpés pour être adaptés. Jeter toute partie inutile du produit après avoir pansé la plaie. Utiliser un sparadrap ou un film protecteur supplémentaire pour créer l'étanchéité.

**4. Retrait du pansement:**

- Le pansement doit être changé lorsque cela est cliniquement indiqué, lorsqu'il est saturé d'exsudat, s'il fuit ou s'il est endommagé ou souillé.
- Si le retrait du pansement est difficile, celui-ci doit être imprégné de sérum physiologique ou d'eau stérile et retiré lentement.
- Pour retirer le pansement, appuyer légèrement sur la peau avoisinant le pansement et soulever avec précaution un coin du pansement. Continuer à soulever le pansement jusqu'à ce que tous les bords soient décollés. Enlever soigneusement le pansement et l'éliminer selon les protocoles cliniques locaux en vigueur.

**Soins de prévention:**

Au cours des soins de prévention uniquement, un coin du pansement peut être soulevé pour inspecter la peau, puis repositionné. Le pansement doit être changé si la peau est lésée.

Si des informations ou des conseils supplémentaires sont nécessaires, ou pour signaler un événement indésirable, veuillez contacter Convatec aux coordonnées disponibles à l'adresse medreg@convatec.com ou celles répertoriées à la fin de ce document.

Fabriqué au Royaume-Uni

© 2024 Convatec.

™/® indiquent une marque d'une société du groupe Convatec.

**PRODUCTBESCHRIJVING**

Convatec® Silicone is een steriel wondverband van Hydrofiber™-schuim, bestaande uit:

- een douchebestendige, ademende buitenste polyurethaanfolie die een bacteriële en virale barrière vormt.
- een zacht, meerlagig, absorberend centraal gaas met polyurethaanschuim, superabsorberende vezels, Hydrofiber™ (natriumcarboxymethylcellulose) en een geperforeerde wondcontactlaag met siliconenhechtmiddel. Het gaas absorbeert in houdt vocht, exsudaat en bacteriën vast.
- een geperforeerde siliconenhechtmiddel voor contactlaag met de wond/huid om het verband aan de huid te plakken.

**KLINISCHE VOORDELEN**

Convatec® Silicone-verband is ontworpen om een vochtige omgeving voor wondgenезing te bieden, terwijl overtuig exsudaat, dat het wondbed en de omringende huid verder kan beschadigen, effectief wordt beheerst.

Convatec® Silicone-verband is ontworpen om intacte huid te beschermen tegen schade door vocht, schuiving en rijkings.

**BEHOOGD GEBRUIK**

Convatec® Silicone-verbanden kunnen, na het raadplegen van een zorgverlener, worden gebruikt voor de behandeling van exsuderende en niet-exsuderende wonden, en voor de bescherming van intacte huid.

Convatec® Silicone-verbanden kunnen ook worden gebruikt op intacte huid als onderdeel van het protocol voor drukletselpreventie.

Convatec® Silicone-verbanden kunnen worden gebruikt als primair of secundair verband.

**INDICATIES**

Convatec® Silicone-verband is geïndiceerd voor de behandeling van:

- Beenulcera
- Decubitus
- Diabetische voetulcera
- Chirurgische wonden
- Traumatische wonden

**CONTRA-INDICATIES**

Convatec® Silicone-verbanden mogen niet worden gebruikt bij personen die gevoelig zijn voor, of een allergische reactie hebben gehad op, het verband of componenten die hierboven in de Productbeschrijving worden genoemd.

**BEHOOGDE GEBRUIKERS**

Convatec® Silicone-verbanden worden gebruikt door zorgverleners, patiënten en verzorgers.

**BEHOOGDE PATIËNTENPOPULATIE**

Convatec® Silicone-verbanden zijn bedoeld voor gebruik bij patiënten met een van de wondtypen vermeld in de indicaties, bij patiënten die huidbescherming nodig hebben tegen huidafbraak of ter preventie van drukletsel op intacte huid als onderdeel van het protocol ter preventie van drukletsel.

**VOORZORGSMAAITREGELLEN**

Convatec® Silicone-verbanden zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig gebruik. Niet opnieuw gebruiken.

Hergebruik kan leiden tot een verhoogd risico op infectie, kruisbesmetting en een vertraagde genezing.

Convatec® Silicone-verbanden zijn niet compatibel met op olie gebaseerde producten.

Breng geen oxiderende oplossingen zoals waterstofperoxide of hypochlorietoplossingen aan op het verband.

Als u oxiderende stoffen gebruikt als onderdeel van een zorgprotocol, zorg dan voor dat de wond en de huid eromheen droog zijn en vrij van resten van oxiderende stoffen voordat u het verband aanbrengt.

Dit verband mag niet worden gebruikt met andere wondzorgproducten zonder eerst een zorgverlener te raadplegen.

Convatec® Silicone-verbanden mogen niet worden ondergedompeld tijdens baden of zwemmen.

Raadpleeg een zorgverlener als een van de volgende situaties wordt waargenomen:

- irritatie (rood worden, ontsteking);
- maceratie (wit worden van huid);
- hypergranulatie (vorming van overtuig weefsel);
- overgevoeligheid of allergische reactie;
- tekenen van infectie (verheviging van pijn, bloeding, warmte/roodheid van omringend weefsel, wondexsudaat);
- veranderingen in wondkleur en/of -geur;
- toename van de grootte van de wond;
- de wond voert geen tekenen van genezing.

Na gebruik kan dit product een potentieel biologisch risico zijn. Hanteren en afvoeren in overeenstemming met geaccepteerde medische praktijk en lokale wet en regelgeving.

Indien tijdens het gebruik of als gevolg van het gebruik van dit hulpmiddel een ernstig incident is opgetreden, moet u dit melden aan de fabrikant op www.convatec.com en de bevoegde autoriteiten in de lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.

**CONTACT EN GEBRUIKSDUUR**

Convatec® Silicone-verbanden kunnen tot 7 dagen worden gedragen.

Verbanden moeten eerder worden vervangen als dit klinisch geïndiceerd is, en zijn veilig voor continu gebruik.

**GEBRUIKSAANWIJZING****1. Bewaren**

- Bewaren bij kamertemperatuur.
- Beschermen tegen licht.
- Droog houden.
- Controleer of het verbandzakje niet beschadigd of geopend is voorafgaand aan gebruik om de steriliteit te garanderen. Als het verband of het zakje beschadigd of geopend is, gebruik het dan niet en voer het af volgens de lokale verordeningen.
- Niet gebruiken na de uiterste gebruiksdatum.

**2. Wondbedpreparatie en reinigen van de huid:**

- Zorg er voor het aanbrengen van het verband voor dat de huid rondom de wond vrij is van crèmes, vochtinbrengers en producten op oliebasis die kunnen verhinderen dat het verband vastplakt.
- Voorafgaand aan het aanbrengen van het verband moet de omringende huid worden gereinigd met een geschikt wondreinigingsmiddel en gedroogd.
- Als een vochtbarrière nodig is, kies een spray of vloeistof die opdroogt voordat het verband wordt aangebracht.

**3. Gereedmaken en aanbrengen van het verband:**

- a. Kies bij het aanbrengen op een wond een geschikte verbandmaat waarvan het centraal absorberend gaas ten minste 1 cm (1/3 inch) groter is dan de wond.
- b. Kies bij het aanbrengen op een intacte huid een verband dat de hele kwetsbare zone bedekt.
- c. Verwijder het verband uit het steriele zakje. Verwijder de beschermfolie. Probeer aanraking van het klevende oppervlak te voorkomen.
- d. Houd het verband over de wond of het te beschermen gedeelte van de huid en breng het midden van het verband op één lijn met het midden van de wond of het te beschermen gedeelte van de huid.
- e. Zorg dat het verband bij het aanbrengen niet wordt uitgerukt. Druk de kleefrand voorzichtig vast. Zorg dat de gewrichten voldoende gebogen zijn om de mobiliteit van de patiënt te behouden. Indien nodig kunnen verbanden op maat worden geknipt. Voer eventueel overgebleven product na het verbinden van de wond af. Gebruik extra tape of folieverband voor het maken van een afsluiting.

**4. Verwijderen van het verband:**

- a. Het verband moet worden vervangen als dat klinisch geïndiceerd is, als het verzadigd is met wondexsudaat, als het lekt of als het beschadigd/vuil wordt.
- b. Als het verband moeilijk te verwijderen is, moet het verband worden gewekt met steriele zoutoplossing of water en langzaam worden verwijderd.
- c. Druk om het verband te verwijderen zachtjes op de huid direct rondom het verband en til voorzichtig een hoek van het verband omhoog. Ga door met het optillen van het verband tot alle randen vrij zijn. Til het verband voorzichtig van de wond en gooi het weg volgens lokale klinische protocollen.

**Beschermende verzorging:**

Alleen tijdens beschermende verzorging kan een hoek van het verband worden opgetild voor inspectie van de huid en opnieuw worden afgesloten. Het verband moet worden vervangen als de huid beschadigd is.

Neem voor verdere informatie of advies, of voor het melden van een bijwerking contact op met Convatec, contactgegevens zijn te vinden op www.convatec.com of gebruik